

四庫全書

經部

欽定四庫全書

子部

蘭室秘藏卷上

詳校官太醫院醫官_臣姜晟

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官中書_臣朱鈐

校對官學正_臣湯垣

謄錄監生_臣陸鼎

欽定四庫全書

子部五

蘭室秘藏

醫家類

提要

臣等謹案蘭室秘藏六卷金李杲撰其曰蘭室秘藏者蓋取黃帝素問藏諸靈蘭之室語前有至元丙子羅天益序在杲沒後二十五年疑即硯堅所謂臨終以付天益者也其治病分二十一門以飲食勞倦居首他如中滿

腹脹如心腹痞如胃脘痛諸門皆諄諄於脾胃蓋其所獨重也東垣發明內傷之類外感實有至理而以土為萬物之母脾胃為生化之源脾虛損論一篇極言寒涼峻利之害尤深切著明蓋預睹劉張兩家末流攻伐之弊而早防其漸也至於前代醫方自金匱要畧以下大抵藥味無多故唐書許允宗傳紀允宗之言曰病之於藥有正相當惟須單用一

味直攻彼病藥力既專病即立愈今人不能
別脈莫識病證以情億度多安藥味譬之於
獵未知兔所多發人馬空地遮圍或冀一人
偶然逢也如此療病不亦疎乎其言歷代醫
家傳為名論惟杲此書載所自製諸方動至
一二十味而君臣佐使相制相用條理井然
他人罕能效之者斯則事由神解不涉言詮
讀是書者能喻法外之意則善矣乾隆四十

四年五月恭校上

總纂官

臣

紀昀

臣

陸錫熊

臣

孫士毅

總校官

臣

陸

費

墀

欽定四庫全書

蘭室秘藏卷上

元 李杲 撰

飲食勞倦門

飲食所傷論

陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六府痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之為二飲也食也飲者水也無形之氣也因

而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺病則為喘咳為腫滿
為水瀉輕則當發汗利小便使上下分消其濕解醒湯
五苓散生薑半夏枳實白朮之類是也如重而畜積為
滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之此其治也食者
物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脈橫
解腸澼為痔又云食傷太陰厥陰寸口大於人迎兩倍
三倍者或嘔吐或痞滿或下痢腸澼當分寒熱輕重而
治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麴乾薑

三稜廣茂巴豆之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮
陳皮麥蘖黃連大黃之類主之亦有宜吐者陰陽應象
論云在上者因而越之瓜蒂散之屬主之然而不可過
劑過劑則反傷腸胃蓋先因飲食自傷又加之以藥過
故腸胃復傷而氣不能化食愈難消矣漸至羸困故五
常政大論云大毒治病十去其六小毒治病十去其七
凡毒治病不可過之此聖人之深戒也

勞倦所傷論

調經篇云陰虛生內熱岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通而胃氣熱熱氣薰胸中故內熱舉痛論云勞則氣耗勞則喘且汗出內外皆越故氣耗矣夫喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故困熱無氣以動懶於語言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之時宜安心靜坐以養其氣以甘寒瀉其熱火以酸味收其散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之者是

也金匱要略云平人脉大為勞脉極虛亦為勞矣夫勞

之為病其脉浮大手足煩熱春夏劇秋冬差

脉大者熱邪也極實

者氣損也春夏劇者時助邪也秋冬差者時勝邪也

以黃耆建中湯治之此亦溫

之之意也夫上古聖人飲食有節起居有常不妄作勞

形與神俱百歲乃去此謂治未病也今時之人去聖人

久遠則不然飲食失節起居失宜妄作勞役形氣俱傷

故病而後藥之是治其已病也推其百病之源皆因飲

食勞倦而胃氣元氣散解不能滋榮百脉灌溉臟腑衛

護周身之所致也故蒼天之氣貴清靜陽氣惡煩勞噫
飲食喜怒之間寒暑起居之際可不慎歟

調中益氣湯

治因飢飽勞役損傷脾胃元氣不足其脈弦洪緩而
沈按之中之下得時一澀其證四肢滿悶肢節疼痛
難以屈伸身體沉重煩心不安忽肥忽瘦四肢懶倦
口失滋味腹難舒伸大小便清利而數或上飲下便
或大便澀滯或夏月餐泄米穀不化或便後見血或

便見白膿胸滿短氣咽膈不通痰唾稠粘口中沃沫
食入反出耳鳴耳聾目中流火視物昏花胛肉紅絲
熱壅頭目不得安卧不思飲食並皆治之

橘皮

如腹中氣不轉運加木香一分如無此證不加

黃蘗

酒洗已上各二分

升麻

此一味為上氣不足胃氣與脾氣下流乃補上氣從陰引陽

柴胡

已上各三分

人參

有嗽者去

炙甘草

蒼朮

已上各五分

黃芪

一錢

如是顯熱躁是下元陰火蒸蒸然發也加

生地黃

二分

黃蘗

三分

如大便虛坐不得或大便秘了而不了腹中常常逼迫

皆是血虛血澀加當歸身三分無此證則去之

如身體沈重雖小便數多亦加茯苓二分黃蘗三分

澤瀉

五分

蒼朮

一錢

時暫從權而去濕也不可常用

兼足太陰已病其脈亦絡於心中故顯濕熱相合而

生煩亂

如胃氣不和加湯洗半夏

五分

生薑

三分

有嗽者加

生薑生地黄

二分

以製半夏之毒

如痰厥頭痛非半夏不能除此足太陰脾邪所作也

如兼躁熱加黃蘗生地黄

各二分

如無以上證只服前藥

右件剉如麻豆大都作一服水二大盞煎去粗稍熱食遠服之寧心絕慮靜坐少語藥必為效耳

如夏月須加白芍藥

三分

如春月腹中痛尤宜加

如惡熱而渴或腹痛者更加芍藥

五分

生黃芩

二分

如惡寒腹痛加中桂

三分

去黃芩謂之桂枝芍藥湯

亦於前藥中加之

如冬月腹痛不可用芍藥蓋大寒之藥也只加乾薑

二分

或加半夏

五分

以生薑

少許

製之

如秋冬之月胃脈四道為衝脈所逆脇下少陽脈二道而反上行名曰厥逆其證氣上衝咽不得息而喘

息有音不得卧加吳茱萸

五分至一錢
湯洗去苦

觀厥氣多少

而用之亦於前藥中作一服服之

如夏月有此證為大熱也此病隨四時為寒熱溫涼也宜以

黃連

酒洗

黃蘗

酒浸

知母

酒浸已上
各等分

右為細末熟湯為丸如梧桐子大每服一百丸或二百丸白湯送下空心服仍多飲熱湯服畢少時便以美食壓之使不令胃中停留直至下元以瀉衝脈之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛勞七損證也常宜以甘溫平之甘多辛少是其治也

寬中喜食無厭丸

一名寬中進食丸

資形氣喜飲食

木香

五分

青皮

人參

乾生薑

已上

各一錢

炙甘草

一錢五分

白茯苓

澤瀉

檳榔

橘皮

白朮

已上各二錢

縮砂仁

猪苓

已上各二錢五分

枳實

四錢

半夏

七錢

草豆蔻仁

五錢神麴

大麥蘖麴

一兩炒

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三五十

九米湯下

食遠

交泰丸

升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食助精神寬腹脇除怠
惰嗜卧四肢沉困不收

乾薑

炮製三分

巴豆霜

五分

人參

去蘆

肉桂

去皮

已上各一分

柴胡

去苗

小椒

炒去汗并閉目者良

白朮

已上

各一錢五分

厚朴

去皮炒二錢秋各加七錢

白茯苓

苦練

酒炙

縮砂仁

已上各三錢

知母

四錢一半酒炒一半酒洗春夏用秋冬去之

川烏

炮製去皮臍
四錢五分

吳茱萸

湯洗七次
五錢

皂角

水洗煨
去皮

紫菀

去苗已上
各六錢

黃連

去鬚七錢
秋冬減一錢五分

右除巴豆霜別研外同為極細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九溫水送下食遠虛實加減

木香人參生薑枳朮丸

開胃進飲食

乾生薑

二錢五分

木香

三錢

人參

三錢五分

陳皮

四錢

枳實

一兩炒

白朮

一兩五錢

右為細末荷葉裏燒飯為丸如梧桐子大每服三五
十丸溫水下食前

木香乾薑枳朮丸

破除寒滯氣消寒飲食

木香

三錢

乾薑

五錢
炮

枳實

一兩
炒

白朮

一兩
五錢

右為細末荷葉裏燒飯為丸如梧桐子大每服三五
十丸溫水送下食前

扶脾丸

治脾胃虛寒腹中痛溏瀉無度飲食不化

乾生薑

肉桂

已上各五分

乾薑

藿香

紅豆

已上各一錢

白朮

茯苓

橘

皮

半夏

訶子皮

炙甘草

烏

梅肉

已上各二錢

大麥蘖

炒

神麴

炒已上各四錢

右為細末荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十丸

白滾湯送下食前

和中丸

補胃進食

人參

乾生薑

陳皮

已上各一錢

乾木

瓜 二錢

炙甘草 三錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十丸
白湯送下食前

檳榔丸

破滯氣消飲食

炙甘草 一錢

木香

人參

檳榔 上已

各二錢

陳皮 五錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九

白湯下食前

消積滯集香丸

治傷生冷硬物不消

京三稜

廣茂

青皮

陳皮

丁香皮 益智

川練子

茴香

已上各一

兩巴豆

和皮米炒五錢

右為細末醋糊為丸如菜豆大每服五七丸溫水送
薑湯任下食前服

黃芪湯

補胃除濕和血益血滋養元氣

木香

氣通去之

霍香葉

已上各一錢

當歸

酒洗

陳皮

已上

各二錢

人參

澤瀉

已上各五錢

黃芪

一兩

右咬咀每服五錢水二大盞煎至一盞如欲汗加生
薑煎食遠熱服之

黃芪當歸湯

治熱上攻頭目沿身胃背發熱

當歸身

一錢
酒洗

黃芪 五錢

右㕮咀作一服水二大盞煎至一盞食前熱服

膀胱經中有寒氣不足者並宜服之於月生月滿時
食隔三五日一服如病急不拘時候

麻黃豆蔻丸

治客寒犯胃心胃大痛不可忍

木香

青皮

紅花

厚朴

已上各二

分蘇木

三分葶澄茄

四分

升麻

半夏

湯洗

麥蘖麴

縮砂仁

黃芪

白朮

陳皮

去白

柴胡

炙甘草

吳茱萸

當歸身

已上各五分

益智仁

五分

神麴

二錢炒

麻黃

不去

分節三草豆蔻仁

五錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十丸
白湯下或細嚼湯下亦可

酒客病論

論酒大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之則止
當發散汗出則愈矣此最妙法也其次莫如利小便二
者乃上下分消其濕何酒病之有今之酒病者往往服
酒癥丸大熱之藥下之又有牽牛大黃下之是無形元
氣痛

人參

甘草

縮砂仁

厚朴

已上

各二錢

白豆蔻

姜黃

乾生薑

澤瀉

已上各
三錢

益智仁

六錢

黃芪

陳皮

已上各
七錢

右為麤末每服三錢水二盞生薑五片煎至一盞去
粗食前溫服

脾胃虛損論

易水張先生常戒不可峻利食藥下咽未至藥丸施化
其標皮之力始開便言快也所傷之物已去若更待一
兩時辰許藥盡化開其藥峻利必有情性病去之後脾

胃既損是真氣元氣敗壞促人之壽當時說下一藥枳實一兩麩炒黃色為度白朮二兩只此二味荷葉裹燒飯為丸以白朮甘溫甘溫補脾胃之元氣其苦味除胃中之濕熱利腰臍間血故先補脾胃之弱過於枳實尅化之藥一倍枳實味苦寒泄心下之痞悶消化胃中所傷此一藥下胃其所傷不能即去須待一兩時辰許食則消化是先補其虛而後化其所傷則不峻利矣當是之時未悟用荷葉燒飯為丸之理老年味之始得可謂

奇矣荷葉之物中央空象震卦之體震者動也人感之
生足少陽甲膽者風也先化萬物之根蒂也內經云內
端於始亨則不愆人之飲食入胃營氣上行即少陽甲
膽之氣也其手少陽三焦經人之元氣也手足經同法
便是少陽元氣生發也胃氣穀氣元氣甲膽上升之氣
一也異名雖多止是胃氣上升者也荷葉之體生於水
土之下出於污穢之中所染挺然獨立其色青形乃空
青而象風木者也食藥感此氣之化胃氣何由不上升

乎其主意用此一味為引味可謂遠識深慮合於道者也更以燒飯和藥與白朮協力滋養穀而補令胃厚再至內傷其利廣矣大矣若內傷脾胃以熱之物酒肉之類自覺不快覓藥於醫醫者亦不問所傷付之集香丸小丁香丸巴豆大熱藥之類下之大便下則物去遺留食之熱性藥之熱性重傷元氣則七神不熾經云熱傷氣正謂此也其後必無氣以動而熱困四肢不舉傳變諸疾不可勝數使人真氣自此衰矣若傷生冷硬物世

醫或用大黃牽牛二味大寒藥投之隨藥下所傷去矣
遺留食之寒性藥之寒性重瀉其陽陽去則皮膚筋肉
血脈無所依倚便為虛損之證論言及此令人寒心夫
辛辣薄味之藥無故不可亂服非止牽牛而已至真要
大論云五味入口各先逐其所喜攻攻者尅伐瀉也辛
味下咽先攻瀉肺之五氣氣者真氣元氣也其牽牛之
辛辣猛烈傷人尤甚飲食所傷腸胃邪當以苦泄其腸
胃可也肺與元氣何以罪之有用牽牛大罪有五此其

一也況胃主血所生病為所傷物者有形之物也皆是
血病瀉其氣其罪二也且飲食傷之於中焦止合尅化
消導其食重瀉上焦肺中已虛之氣其罪三也食傷腸
胃當寒因寒用又曰寒因寒用枳實大黃苦寒之物以
泄有形是也反以辛辣牽牛散瀉真氣大禁四也殊不
知鍼經有云外來客邪風寒傷人五臟若誤瀉胃氣必
死誤補亦死其死也無氣以動故靜若內傷腸胃而反
瀉五臟必死誤補亦死其死也陰氣有餘故躁今內傷

腸胃是謂六腑不足之病反瀉上焦虛無肺氣肺者五臟之一數也雖不即死若更旬日之間必暗損人壽數謂如人壽應百歲為牽牛之類朝損暮損損其元氣消耗不得終其天年但人不覺耳將為天年已盡此乃暗裏折人壽數故特著此論并方庶令四海聞而行之不至夭橫耳老夫之用心也胃氣不可不養復明養胃之理內經云安穀者昌絕穀者亡去則榮散穀消則亡榮散衛亡神無所依仲景云水入於經其血乃成穀入於

胃脈乃大行故血不可不養胃不可不溫血溫胃和榮
衛將行常有天命穀者身之大柄也書與周禮皆云金
木水火土穀惟脩以奉養五臟者也內傷飲食固非細
事苟妄服食藥而輕生損命其可乎哉黃帝鍼經有說
胃惡熱而喜清冷大腸惡清冷而喜熱兩者不和何以
調之岐伯曰調此者食飲衣服亦欲適寒溫寒無悽愴
暑無汗飲食者熱無灼灼寒無淒淒寒溫中適故氣調
乃不致邪僻也是必有因用豈可用俱寒俱熱之藥倉

卒致損與以刃殺人者何異內經說內傷者其氣口脈反大於人迎一倍二倍三倍分經用藥又曰上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死如但食不納惡心欲吐者不問一部二部不當正與瓜蒂散吐之但以指或以物探去之若所傷之物去不盡者更診其脈問其所傷以食藥去之以應塞因塞用又胃之寒因泄而下降乃應太陰之用其中更加升發之藥令其元氣上升塞因通用因曲而為直何為曲內傷胃氣是也何為直因而

升發胃氣是也因其飲食之內傷而使生氣增益胃氣
寬復此乃因曲而為之直也若分經用藥其所傷之物
寒熱溫涼生硬柔輒所傷不一難立定一法只隨所傷
之物不同各立治法臨時加減用之其用藥又當問病
人從來稟氣盛衰所傷寒物熱物是喜食之邪不可服
破氣藥若乘飢困而傷之邪當益胃氣或為人所勉勸
強食之宜損血而益氣也診其脈候傷在何臟可與對
病之藥豈可妄瀉天真生氣以輕身喪寶乎且如先食

熱物而不傷繼之以寒物因後食致前食亦不消化而傷者當問熟食寒食孰多孰少斟酌與藥無不當矣喻如傷熱物二分寒物一分則當用寒藥二分熱藥一分相合而與之則榮衛之氣必得周流更有或先飲酒而後傷寒冷之食及傷熱食冷水與冰如此不等皆當驗其節次所傷之物酌量寒熱之劑分數各各對證與之無不取效自忖所定藥方未敢便謂能盡性之理姑用拍迷辯惑耳

三黃枳朮丸

治傷肉濕麵辛辣味厚之物填塞悶亂不快

枳實

楚炒
五錢

黃連

去鬚
酒洗

大黃

濕紙
裏煨

神麴

炒

橘皮

白朮

已上各
一兩

黃芩

二兩

右為極細末湯浸餗餅為丸如菜豆一倍大每服五
十九白湯下量所傷多少加減服之

巴豆三稜丸

一名木香見現丸

半夏

湯洗
七次

神麴

炒已上
各五錢

草豆蔻

麵裏煨去
皮取仁

白朮

已上各

一兩

枳實

麩炒
二兩

右為極細末湯浸餗餅為丸如菉豆大每服五十九
白湯下

中滿腹脹門

中滿腹脹論

六元政紀論云太陰所至為中滿太陰所至為畜滿諸
濕腫滿皆屬脾土論云脾乃陰中之太陰同濕土之化
脾濕有餘腹滿食不化天為陽為熱主運化地為陰為

濕主長養也無陽則陰不能生化故云藏寒生滿病調
經篇云因飲食勞倦損傷脾胃始受熱中未傳寒中皆
由脾胃之氣虛弱不能運化精微而制水穀聚而不散
而成脹滿經云腹滿臍脹支膈肱脇下厥上冒過在太
陰陽明乃寒濕鬱遏也脈經所謂胃中寒則脹滿者是
也

鍼經二卷
雜病第八

腹滿大便不利上走胃溢喘息喝喝然取

足少陰又云脹取三陽三陽者足太陽寒水為脹與通
評虛實論說腹暴滿按之不下取太陽經絡胃之募也

正同取者瀉也經云中滿者瀉之於內者是也宜以辛
熱散之以苦瀉之淡滲利之使上下分消其濕正如開
鬼門潔淨府溫衣繆刺其處是先瀉其血絡後調其真
經氣血平陽布神清此治之正也或曰諸脹腹大皆屬
於熱者何也此乃病機總辭假令外傷風寒有餘之邪
自表傳裏寒變為熱而作胃實腹滿仲景以大承氣湯
治之亦有膏粱之人濕熱鬱於內而成脹滿者此熱脹
之謂也大抵寒脹多而熱脹少治之者宜詳辯之

諸腹脹大皆屬於熱論

諸腹脹大皆屬於熱此乃八益之邪有餘之證自天外而入是感風寒之邪傳裏寒變為熱作胃實日晡潮熱大渴引飲讖語是太陽陽明并大實大滿者大承氣湯下之少陽陽明微滿實者小承氣湯下之泄之則脹已此之謂也假令瘧病為脹滿亦有寒脹熱脹是天之邪氣傷暑而得之不即時發至秋暑氣衰絕而瘧病作矣知其寒也局方用交解飲子者是也內虛下實寒濕令人

中滿乃五臟六腑俱有脹滿更以脈象寒熱多少較之
胃中寒則脹滿濁氣在上則生脹腹脹取三陽三陽者
足太陽膀胱寒水為脹腹暴滿按之不下取太陽經絡
者胃之募也正同腹滿腹脹肢膈脘脇下厥上冒過在
太陰陽明胃中寒濕鬱遏也太陰腹脹復不利不欲食
食則嘔不得卧按所說寒脹之多如此中滿治法當開
鬼門潔淨府開鬼門者謂發汗也潔淨府者利小便也
中滿者瀉之於內謂脾胃有病令上下分消其氣下焦

如瀆氣血自然分化不待泄滓穢如或大實大滿大小
便不利從權以寒熱藥下之或傷酒濕麵及味厚之物
膏粱之人或食已便卧使濕熱之氣不得施化致令腹
脹滿此脹亦是熱治熱脹分消丸主之

如或多食寒涼及脾胃久虛之人胃中寒則脹滿或藏
寒生滿病以治寒脹中滿分消湯主之

中滿分消丸

治中滿熱脹鼓脹氣脹水脹此非寒脹類

白朮

人參

炙甘草

猪苓

去黑

皮

姜黃

已上各一錢

白茯苓

去皮

乾生薑

砂仁

已上各二錢

澤瀉

橘皮

已上各三錢

知母

炒四錢

黃

芩

去腐炒夏用一錢二分

黃連

淨炒

半夏

湯洗七次

枳

實

炒已上各五錢

厚朴

薑製一兩

右除茯苓澤瀉生薑外共為極細末入上三味和勻

湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服一百丸焙熟白湯

下食遠服量病人大小加減

中滿分消湯

治中滿寒脹寒疝大小便不通陰燥足不收四肢厥
逆食入反出下虛中滿腹中寒心下痞下焦燥寒沉
厥奔豚不收

川烏

澤瀉

黃連

人參

青皮

當歸

生薑

麻黃

柴胡

乾薑

葷澄茄

已上各二錢

益智

仁

半夏

茯苓

木香

升麻

已上

各三分

黃芪

吳茱萸

厚朴

草

豆蔻仁

黃蘗

已上各五分

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞食前熱服忌房室酒濕麵生冷及油膩等物

廣茂潰堅湯

治中滿腹脹内有積聚堅硬如石其形如盤令人不能坐卧大小便澀滯上喘氣促面色痿黃通身虛腫

廣茂

紅花

升麻

吳茱萸

已上

各二分

生甘草

柴胡

澤瀉

神麴

青皮

陳皮

已上各三分

厚朴

生用

黃芩

黃連

益智仁

草豆蔻仁

當歸梢

已上各三分

半夏

如渴加

葛根 四分

右剉如麻豆大水二大盞煎至一盞稍熱服食遠忌酒醋濕麵服二服之後中滿減半有積不消再服後

藥

半夏厚朴湯

紅花

蘇木

已上各五厘

吳茱萸

乾生薑

黃連

已上各一分

木香

青皮

已上各二分

肉桂

蒼朮

白茯苓

澤瀉

柴胡

陳皮

生黃芩

草豆蔻仁

生甘草

已上各三分

京三稜

當歸梢

猪苓

升

麻

已上各四分

神麴

六分

厚朴

八分

半夏

一錢

桃仁

七箇

昆布

少許

如渴加

葛根

三分

右咬咀作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱服此藥
二服之後前證又減一半却於前藥中加減之

破滯氣湯

一名木香化滯散

破滯氣治心腹滿悶

炙甘草

四分

白檀

藿香

陳皮

大腹子

白豆蔻仁

白茯苓

桔梗

已上各五分

砂仁

人參

青皮

檳榔

木香

姜黃

白朮

已上各三錢

右吹咀每服三錢水二盞煎至一盞去粗溫服不拘時

草豆蔻湯

治腹中虛脹

澤瀉 一分

木香 三分

神麴 四分

半夏 製

枳實

草豆蔻仁

黃芪

春夏去之

益智

甘草

已上各五分

青皮

陳皮

已上各六分

茯苓

當歸

已上各七分

右為麤末都作一服水二大盞生薑三片煎至一盞去粗溫服冬月加黃芪五七分春夏止服正藥食遠

心腹痞門

消痞丸

治心下痞悶一切所傷及積年不愈者

乾生薑

神麴

炒

炙甘草

已上各二錢

猪

苓

二錢五分

澤瀉

厚朴

砂仁

已上

人參

已上

各三

半夏

湯洗七次

陳皮

黃芩

已上各六

錢

各四

枳實

五錢炒

黃連

淨炒

錢

姜黃

白朮

已上各一兩

右為細末湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服五七十

九至百九白湯送下食遠服

失笑丸

一名枳實消痞丸

簡室秘藏

火定司庫

治右關脈弦心下虛痞惡食懶倦開胃進飲食

乾生薑 一錢

炙甘草

麥蘖麴

白

茯苓

白朮

已上各二錢

半夏麴

人參

已上

各三錢

厚朴

四錢炙

枳實

黃連

已上各五錢

右為細末湯浸餗餅為丸梧桐子大每服五七十九

白湯下食遠服

黃連消痞丸

治心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不安

澤瀉

姜黃

已上各一錢

乾生薑

二錢

炙甘草

茯苓

白朮

已上各三錢

陳皮

五錢

猪苓

已上各五錢

枳實

七錢炒

半夏

九錢

黃連

一兩

黃芩

二兩炒

右為細末湯浸餛餅為丸如梧桐子大每服五十九
溫湯下食遠服

消痞丸

一名木香化滯湯

治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微痛心下痞滿不思飲
食

枳實

炒

當歸梢

已上各二分

陳皮

生薑

木香

已上各三分

柴胡

四分

草豆蔻

炙甘草

已上各五分

半夏

一錢

紅花

少許

右為麤末作一服水二盞生薑三片煎至一盞食遠

服忌酒濕麵

寧蘼丸

一名人參順氣飲子

治心下痞胃中不利

半夏

洗

厚朴

炙

石膏

青皮

已上各五

分
當歸身分七 白豆蔻仁 縮砂

茵陳 酒製

乾葛已上各一錢 炙甘草 羌活

黃芩一半酒洗一半

炒
苦葶藶酒洗 人參 柴胡

獨活已上各三

錢

右為細末湯浸餗餅和勻篩子內擦如米大每服二錢臨卧用一口湯下

胃脘痛門

草豆蔻丸

治脾胃虛弱而心火乘之不能滋榮上焦元氣遇冬
腎與膀胱寒水旺時子能令母實以致肺金大腸相
輔而來尅心乘脾胃此大復讎也經云大勝必大復
理之常也故皮毛血脈分肉之間元氣已絕於外又
大寒大燥二氣併乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相
引而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛大惡風寒目
時眩不欲開腹中為寒水反乘痰唾沃沫食則反出
腹中常痛心胃作痛脇下縮急有時而痛腹不能努

大便多瀉而少秘下氣不絕或腹中鳴此脾胃虛之
至極也胃中氣亂心煩不安而為霍亂之漸咽膈不
通極則噎寒有聲喘喝閉寒或於日陽處或於煖室
中少緩口吸風寒之氣則復作四肢厥逆身體沉重
不能轉側頭不可以回顧小便澀而時躁此藥主之
秋冬寒涼大復氣之藥也

神麴末

柴胡

詳膈下痛
多少用之

姜黃

已上各
四分

當歸身

青皮

各六
分

黃芪

人參

益智仁

吳茱萸

湯洗焙乾

陳皮

白僵蠶

已上各八分

澤瀉

小便教減半

半夏

已上各一錢

甘草

生六分熟六分

麥蘖麵

一錢五分炒

草豆蔻仁

麵裹燒熟為末錢四分

桃仁

七箇湯浸去皮尖

右除桃仁別研如泥餘為細末同研勻湯浸餛餅為丸如梧桐子大每服五七十九白湯下食遠服

神聖復氣湯

治復氣乘冬足太陽寒水足少陰腎水之旺子能令母實手太陰肺實反來尅土火木受邪腰背胃膈閉

塞疼痛善嚏口中涎目中泣鼻中流濁涕不止或如
息肉不聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒如水頭作
陣痛目中溜火視物眈眈耳聾耳鳴頭并口鼻大惡
風寒喜日晴暖夜卧不安常覺痰塞咽膈不通口不
知味兩脇縮急而痛牙齒動搖不能嚼物臍腹之間
及尻臀足膝不時寒冷前陰冷而多汗行步欹側起
居艱難麻木風痺小便數氣短喘咳少氣不足以息
遺失無度及婦人白帶陰戶中大痛牽心面色黧黑

男子控睪痛牽心腹或面色如飯食少大小便不調
煩心霍亂逆氣裏急腹不能努或腸鳴膝下筋急肩
胛大痛此皆寒水來復火土之讎也

乾薑

炮

黑附子

炮已上
各三分

防風

人參

郁李仁

另研已上
各五分

當歸身

六分
酒洗

半夏

湯洗

升麻

已上各
七分

藁本

甘草

已上各
八分

柴胡

羌活

已上各
一錢

白葵花

五朶去
心剪碎

右件都作一服水五大盞煎至二盞入黃芪一錢橘

紅五分草豆蔻仁一錢麴裹煨熟去皮一錢同煎至
一盞再入下項藥黃蘗三分酒浸黃連三分酒浸枳
殼三分生地黃三分酒洗此四味預一日另用新水
浸又以華細辛二分川芎細末三分蔓荊子三分作
一處浸此三味并黃蘗等煎正藥作一大盞不去粗
入此所浸之藥再上火同煎至一大盞去粗熟服空
心又能治嚙頰嚙唇舌舌根強硬等證如神忌肉湯
宜食肉不助經絡中火也大抵腎元與膀胱經中有

寒氣不足者並宜服之於月生月滿時食隔二五日
一服如病急不拘時候

麻黃豆蔻丸

治客寒犯胃心胃大痛不可忍

木香

青皮

紅花

厚朴

已上各二分

蘇木

三分

葶澄茄

四分

升麻

半夏

湯洗

麥

藥麵

縮砂仁

黃芪

白朮

陳皮

去白

柴胡

炙甘草

吳茱萸

當歸身

已上各五分

益智仁

八分

神麴末

二錢

麻黃

不去節三錢

草豆蔻仁

五錢

右為細末湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服五十丸
白湯下或細嚼湯下亦可

酒客病論

論酒大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之則止
當發散汗出則愈矣此最妙法也其次莫如利小便二
者乃上下分消其濕何酒病之有今之酒病者往往服

酒癰九大熱之藥下之又有牽牛大黃下之是無形元氣受病反下有形陰血乖悞甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之况亦損腎水真陰及有形陰血俱為不足如此則陰血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是謂元氣消亡七神何依折人長命雖不即死而虛損之病成矣金匱要畧云酒疸下之久久為黑疸慎不可犯此戒不若令上下分消其濕當以葛花解酲湯主之

葛花解醒湯

木香

二錢

人參

去蘆

猪苓

去黑皮

白茯苓

橘皮

已上各一錢五分

白朮

乾生薑

神麴

炒

澤瀉

已上各一錢

葛花

五錢

縮砂仁

五錢

四花青皮

三錢

白豆蔻仁

五錢

右為極細末和勻每服三錢匕白湯調下但得微汗

酒病去矣此蓋不得已而用豈可恃賴日日飲酒此

藥氣味辛辣偶因酒病服之則不損元氣何者散酒

病故也若頻服之損人天命

枳朮丸

治痞消食強胃

枳實

微炒黃
色一兩

白朮

二兩

右為極細末荷葉裹燒飯為丸如菜豆大倍大每服
五十九白湯下不拘時候量所傷多少加減服之

半夏枳朮丸

治因冷物內傷

半夏

湯洗七次一兩

枳實

麴炒黃色

白朮

已上各三兩

右三味為極細末荷葉裹燒炊飯為丸如菉豆一倍大每服五十九白湯下量所傷加減服之

橘皮枳朮丸

治元氣虛弱飲食不消或臟腑不調心下痞悶

橘皮

枳實

麴炒黃色各一兩

白朮

二兩

右為極細末荷葉裹燒飯為丸如菉豆一倍大每服五十丸白湯下量所傷加減服之

除濕益氣丸

治傷濕麵心腹滿悶肢體沉重

紅花 三分

蘿蔔子

炒熟
五錢

枳實

麩炒
黃色

黃芩

生

用神麴

炒黃
色

白朮

已上各
一兩

右同為極細末荷葉裹燒飯為丸如棗豆一倍大每服五十丸白湯下量所傷加減服之

除濕散

治傷馬妳子并牛羊酪水一切冷物

甘草

炙

紅花

已上各二錢

半夏

湯洗七次

乾生薑

已上

各三錢

車前子

澤瀉

已上各五錢

茯苓

七錢

神麴

炒黃色

一兩

右為極細末每服三錢七白湯調下食前

升麻黃連丸

治多食肉口臭不欲聞其穢惡氣使左右不得近

白檀

二錢

生甘草

三錢

生薑

取自然汁

蓮花

青皮

升麻

已上各五錢

黃連

去鬚一兩

黃芩

去腐

酒洗

二兩

右為極細末湯浸餗餅為丸如彈子大每服一九細嚼白湯下食後

上二黃丸

治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

甘草

二錢

升麻

柴胡

已上各三錢

黃連

酒洗一兩

黃芩

二兩

一方加

枳實

五錢

右為細末湯浸餗餅為丸如菉豆大每服五十丸白湯下食遠服

治傷冷飲者以五苓散每服二錢三錢匕加生薑煎服之

治傷食兼傷冷飲者煎五苓散送半夏枳朮丸

治傷冷飲不惡寒者腹中亦不覺寒惟覺悶身重食不化者或小便不利煎去桂五苓散依前斟酌服之

瓜蒂散

上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死何謂下部
無脉此謂木鬱也飲食過飽填塞胃中胃中者太陰
之分野經曰氣口反大於人迎三倍食傷太陰故曰
木鬱則達之吐者是也

瓜蒂

赤小豆

已上各
等分

右二味為極細末每服二錢匕溫漿水調下取吐為
度若不至兩手尺脉絕無不宜便用此藥恐損元氣

令人胃氣不復若止是胃中窒塞悶亂不通以指探去之如不得吐者以物探去之得吐則已如食不去用此藥吐之解云盛食填塞於胃中為之窒塞兩寸脈當主事兩尺脈不見其理安在胃中有食故以吐出之食者物也物者坤土也是足太陰之號也胃中者肺也為物所填肺者手太陰金也金主殺伐也與坤土俱在於上而旺於天金能尅木故肝木生發之氣伏於地下非木鬱而何吐去上焦陰土之物木得

舒暢則鬱結去矣食塞於上脈絕於下若不明天地之道無由達此至理水火者陰陽之徵兆天地之別名也故曰獨陽不生獨陰不長天之用在於地下則萬物生長矣地之用在於天上則萬物收藏矣此乃天地交而萬物通也此天地相根之道也故陽火之根本於地下陰水之源本於天上故曰水出高原故人五臟主有形之物物者陰也陰者水也右三部脈主之偏見於寸口食塞其上是絕五臟之源源絕則

水不下流兩尺竭絕此其理也何疑之有假令所傷前後不同以分為率傷熱物二分傷生冷硬物一分用寒藥三黃九二停熱藥巴豆三稜九一停合而服之如熱物傷少而寒物傷多則寒藥少而熱藥多也假令夏月大熱之時傷生冷硬物當用熱藥巴豆三稜九治之須加三黃九謂天時不可伐故加寒藥以順時令若熱物只用三黃九何謂此三黃九時藥也假令冬天大寒之時傷羊肉濕麵等熱物當用三黃

九治之須加熱藥少許草豆蔻丸之類是也為引用
人為時藥經云必先歲氣無伐天和此之謂也餘皆
倣此

消渴門

消渴論

陰陽別論云二陽結謂之消脈要至微論云痺成為消
中夫二陽者陽明也手陽明大腸主津病消則目黃口
乾是津不足也足陽明胃主血熱則消穀善飢血中伏

火乃血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱為病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也不可服膏粱芳草石藥其氣慄悍能助燥熱也越人云邪在六腑則陽脈不和陽脈不和則氣留之氣留之則陽脈盛矣陽脈大盛則陰氣不得營也故皮膚肌肉消削是也經云凡治消痺仆繫偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏之疾也岐伯曰脈實病久可治脈弦小病久不可治後分為三消高消者舌上赤裂大

渴引飲逆調論云心移熱於肺傳於膈消者是也以白
虎加人參湯治之中消者善食而瘦自汗大便硬小便
數叔和云口乾飲水多食飢虛癰成消中者是也以調
胃承氣三黃丸治之下消者煩躁引飲耳輪焦乾小便
如膏叔和云焦煩水易虧此腎消也以六味地黃丸治
之總錄所謂末傳能食者必發腦疽背瘡不能食者必
傳中滿鼓脹皆謂不治之證潔古老人分而治之能食
而渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢氏方白朮散

倍加葛根治之上中既平不復傳下消矣前人用藥厥有旨哉或曰未傳瘡疽者何也此火邪勝也其瘡痛甚而不潰或赤水者是也經云有形而不痛陽之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得强者生失强者死未傳中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢其繩墨而更其道也然臟腑有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大其服皆適其至所為當如過與不及皆誅罰無過之地也如高消中消制之大急速過病所久而

成中滿之病正謂上熱未除中寒復生者也非藥之罪
失其緩急之制也處方之制宜加意焉

和血益氣湯

治口乾舌乾小便數舌上赤脈此藥生津液除乾燥
生肌肉

柴胡

炙甘草

生甘草

此味治口乾舌乾

麻

黃根

已上各三錢

酒當歸梢

四分酒知母

酒漢防

已

羌活

已上各五分

石膏

六分治小便赤色

酒生地

黃

七分

酒黃連

八分治舌上赤脉也

酒黃蘗

升麻

已上

各一錢

杏仁

桃仁

已上各六箇

紅花

少許

右吹咀都作一服水二大盞煎至一盞去粗溫服忌熱濕麵酒醋等物

當歸潤燥湯

治消渴大便閉澀乾燥結硬兼喜溫飲陰頭退縮舌燥口乾眼澀難開及於黑處見浮雲

細辛

一分

生甘草

炙甘草

熟地

黃

已上各三分

柴胡

七分

黃蘗

知母

石膏

桃仁

泥子

當歸身

麻子

仁

防風

荊芥穗

已上各一錢

升麻

一錢

五分

紅花

少許

杏仁

六箇

小椒

三箇

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去粗熱服食
遠忌辛熱物

生津甘露湯

一名清涼飲子

治消中能食而瘦口舌乾自汗大便結燥小便頻數

升麻 四分

防風

生甘草

漢防已

生地黃

各五分

當歸身

六分

柴胡

羌活

炙甘草

黃芪

酒知母

酒黃芩

已上一

錢

酒龍膽草

石膏

黃蘗

各一錢五分

紅花

少許

桃仁

五箇

杏仁

十箇

右咬咀都作一服水二盞酒一匙煎至一盞稍熱服

食遠

辛潤緩肌湯

一名清神補氣湯

前消渴證纔愈止有口乾腹不能勞此藥主之

生地黃

細辛

已上各一分

熟地黃

三錢

石膏

四分

黃蘗

酒製

黃連

酒製

生甘草

知母

已上各五分

柴胡

七分

當歸身

荊芥穗

桃仁

防風

已上各一錢

升麻

一錢五分

紅花

少許

杏仁

六箇

小椒

二箇

右㕮咀都作一服水二大盞煎至一盞食遠稍熱服之

甘草石膏湯

渴病久愈又添舌白滑微腫咽喉嚥津覺痛噎腫時
時有渴喜冷飲口中白沫如膠

生地黄

細辛

已上各一分

熟地黄

黃連

已上各三

分甘草 五分

石膏

五分

柴胡

七分

黃蘗

知母

當歸身

桃仁

炒去皮尖

荊芥穗

防風

已上各一錢

升麻

一錢五分

紅花

少許

杏仁

六箇

花椒

二箇

右如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食後溫服

甘露膏

一名蘭香飲子

治消渴飲水極甚善食而瘦自汗大便結燥小便頻數

半夏

二分酒洗

熟甘草

白豆蔻仁

人參

蘭香

升麻

連翹

桔梗

已上各五分

生甘草

防風

已上各一錢

酒知母

一錢五分

石膏

三錢

右為極細末酒浸蒸餅和勻成劑捻作薄片子日中

晒半乾擦碎如米大每服二錢淡生薑湯送下食後生津甘露飲子

治消渴上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不能下時有腹脹或瀉黃如糜名曰餐泄渾身色黃目睛黃甚四肢痿弱前陰如水尻臀腰背寒面生黧色脇下急痛善噦喜怒健忘

藿香

二分

柴胡

黃連

木香

已上各三

分
白葵花

麥門冬

當歸身

蘭香

已上各五

分
葶澄茄

生甘草

山梔子

白豆蔻

仁
白芷

連翹

姜黃

已上各
一錢

石膏

一錢
一分

杏仁

去皮

酒黃蘗

各一錢
五分

炙甘草

酒知母
升麻

人參

已上各
二錢

桔梗

三錢

全蝎

二箇
去毒

右為細末湯浸餛餅和勻成劑捻作片子日中晒半
乾擦碎如黃米大每服二錢津唾下或白湯送下食
遠服

眼耳鼻門

諸脈者皆屬於目論

陰陽應象論云諸脈者皆屬於目目得血而能視五臟
六腑精氣皆上注於目而為之精精之窠為眼骨之精
為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡為窠氣之精為白
眼肌肉之精則為約束裹擷筋骨血氣之精而與脈并
為系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之
虛其入深則即隨眼系入於腦則腦轉腦轉則引目系

急目系急則目眩以轉矣邪中其精其精所中不相比也則精散精散則視岐故見兩物目者五臟六腑之精榮衛魂魄之所常營也神氣之所主也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼發於陰白眼赤脈發於陽故陰陽合傳而為精明也目者心之使也心者神之舍也故神精亂而不轉卒然見非常之處精神魂魄散不相得故曰惑也夫十二經脈三百六十五絡其血氣皆上走於面而走空竅其精陽氣上散於目而為精其氣走

於耳而為聽因心事煩冗飲食失節勞役過度致脾胃
虛弱心火大盛則百脈沸騰血脈逆行邪害空竅天明
則日月不明矣夫五臟六腑之精氣皆秉受於脾上貫
於目脾者諸陰之首也目者血脈之宗也故脾虛則五
臟之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主
人之神宜靜而安相火代行其令相火者包絡也主百
脈皆榮於目既勞役運動勢乃妄行又因邪氣所并而
損血脈故諸病生焉凡醫者不理脾胃及養血安神治

標不治本是不明正理也

內障眼論

凡心包絡之脈出於心中以代心君之行事也與少陽為表裏瞳子散大者少陰心之脈挾目系厥陰肝之脈連目系心主火肝主木此木火之勢盛也其味則宜苦宜酸宜涼大忌辛辣熱物是瀉木火之邪也飲食中常知此理可也瀉辛主散熱則助火故不可食諸酸主收心氣瀉木火也諸苦瀉火熱則益水也尤忌食冷水大

寒之物此則能損胃氣不行則元氣不生元氣不行胃氣下流胃中三焦之火及心火乘於肺上入腦灼髓火主散益瞳子開大大熱之物又助火邪此蓋不可食驗也藥中云荒蔚子一味辛及主益睛睛者助火也故去之乃知黃芩黃連瀉中焦之火芩能瀉上焦肺中之火以酒洗之乃寒因熱用也又去青箱子為助陽火也加五味子以收瞳人開大且火之與氣勢不兩立故內經曰壯火食氣氣食少火少火生氣壯火散氣諸酸之物

能助元氣孫真人云五月常服五味助五臟氣以補西方肺金法云以酸補之以辛瀉之辛瀉氣則明矣或曰藥中有當歸其味亦辛而甘其不去者何此辛甘一味以其和血之勝藥況有甘味又欲以為鄉導為諸藥之俊耳

芎辛湯

治兩眼晝夜隱澀難開羞明惡日視物昏暗赤腫而痛

細辛 二分

芎藭

蔓荊子 已上各五分
甘草

白芷 已上各一錢
防風 一錢五分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞臨卧溫服

碧天丸 一名井珠丸

治目疾累服寒涼藥不愈兩眼蒸熱如火之熏赤而不痛滿目紅絲血脈貫睛翳悶昏暗羞明畏日或上下臉赤爛或冒風沙而內外皆皆破洗之神效

枯白礬 一分

銅碌 七分
研

瓦粉 炒黑一兩

右先研白礬銅碌令細放入粉同研勻熟水和之
共為一百丸每用一丸熱湯半盞浸一二箇時辰洗
至覺微澀為度合半時辰許臨卧洗之明日便睡一
丸可洗十遍再用湯內坐令熱此藥治其標若裏實
者不宜用

廣大重明湯

治兩目臉赤爛熱腫疼痛并稍赤及眼臉痒痛抓之
至破眼弦生瘡目多眵淚隱澀難開

龍膽草

防風

生甘草

細辛

已上各
一錢

右剉如咀內甘草不剉只作一錠先以水一大碗半煎龍膽一味至一半再入餘三味煎至少半碗瀉去粗用清帶熱洗以重湯坐令熱日用五七次但洗畢合眼一時去努肉泛長及痒亦驗

百點膏

張濟氏眼病翳六年以至遮瞳人視物不明有雲氣

之狀因用此藥而效

薤仁

去皮夫三分

當歸身

甘草

已上各六分

防風

八分

黃連

揀淨二錢判如麻豆大水一大碗煎至一半入藥

右件判如麻豆大薤仁別研如泥同熬滴在水中不散入去沫蜜少許再熬少時為度令病人心靜點之至目中微痛日用五七次臨卧點尤疾效名之曰百點膏但欲多點使藥力相繼也

選奇湯

治眉骨痛不可忍

炙甘草

夏月生用

羌活

防風

已上各三錢

酒黃芩

一錢

冬月不用此一味如能食熱痛加倍之

右吹咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食後服之神効明目湯

治眼楞緊急致倒睫拳毛及上下臉皆赤爛睛疼昏暗晝則冷淚常流夜則眼澀難開

細辛

二分

蔓荊子

五分

防風

一錢

葛根

一錢

五
分 甘草 二錢

一方加

黃芪 一錢

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱臨卧服

羌活退翳膏 一名復明膏

治足太陽寒水膜子遮睛白翳在上視物不明

椒樹

東南根二分
西北根二分

藁本

漢防己

已上各
二分

黃連

防風

麻黃

去根
節

柴胡

升麻

生地黄

已上各三分

生甘草

四分

當歸

身六分

羌活七分

薤仁六箇

右用淨水一大碗先煎漢防已黃連生甘草當歸生地黃煎至一半下餘藥再煎至一盞去粗入銀石器內再熬之有力為度

明目細辛湯

治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒怕火眼睫成紐眵糊多隱澀難開眉攢腫悶鼻塞涕唾稠粘大便微

硬

川芎

五分

生地黄

酒洗

蔓荊子

已上各
六分

當歸梢

白茯苓

藁本

已上各
一錢

荊芥

一錢
二分

防風

二錢

麻黃根

羌活

各三
錢

細辛

少許

紅花

少許

椒

八箇

桃仁

二十
箇

右吹咀分作四服每服水二盞煎至一盞去粗稍熟
臨卧服之忌酒醋濕麵

復明散

治內瘡

青皮

三分

橘皮

川芎

蒼朮

各五
已上

分
炙甘草

生地黄

連翹

柴胡

各一
已上

錢

黃芪

一錢
五分

當歸身

一錢

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去粗
稍熟服之食後忌酒醋濕麵辛熱大料物之類

助陽和血湯

治眼發之後微有上熱白睛紅隱澀難開多眵淚

蔓荊子 二分

香白芷 三分 柴胡

黃芪

炙甘草

當歸身

酒洗

防風

已上各五分

升麻

七分

右吹咀都作一服水一盞半煎至八分去粗稍熱服
臨卧避風寒處腫

吹雲膏

治目中淚及迎風寒泣羞明畏日常欲閉目喜在暗
室塞其戶牖翳癢歲久遮睛此藥多點神驗

細辛 一分

升麻

蕤仁

已上各三分

青皮

連翹

防風

已上各四分

柴胡

生甘草

當歸身

已上各六分

生地黃

一錢五分

荊芥穗

一錢微取

濃汁揀黃連 三錢

右㕮咀除連翹外用澄清淨水二椀先熬餘藥至半椀入連翹同熬至一大盞許去粗入銀石器內文武火熬滴水成珠不散為度入煉去沫熟蜜少許熬勻用之

防風飲子

治倒睫拳毛

細辛

蔓荊子

已上各三分

葛根

防風

已上

各五分

當歸身

七分

炙甘草

黃連

人參

已上各一錢

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食遠服

避風寒

撥雲湯

戊申六月徐總管患眼疾於上眼皮下出黑白翳兩

箇隱澀難開兩目緊縮而無疼痛兩手寸脉緊按
之洪大無力知足太陽膀胱為命門相火煎熬逆行
作寒水腎及寒癰遮睛證呵欠善悲健忘嚔噴眵淚
時自淚下面赤而白能食不大便小便數而欠氣上
而喘

黃芪 一分

細辛

生薑

葛根

川芎

已上各五分

柴胡

七分

荊芥穗

藁本

生甘草

升麻

當歸身

知母

已上各一錢

羌活

防風

黃蘗

已上各一錢五分

右咬咀如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗

熱服食後

神效黃芪湯

治渾身麻木不仁或頭面手足肘背或腿脚麻木不仁並皆治之

如兩目緊急縮小及羞明畏日隱澀難開或視物無力睛痛昏花手不得近目少睛光或目中熱如火服五

六次可效

蔓荊子

一錢

陳皮

去白
五錢

人參

八錢

炙甘草

白芍藥

各一
兩

黃芪

二兩

右吹咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗臨卧稍熱服

如小便淋澀加澤瀉五分一服去則止

如有大熱證每服加酒洗黃蘗三分

如麻木不仁雖有熱不用黃蘗止加黃芪一兩通三

兩也

如眼縮急去芍藥忌酒醋麵大料物蔥韭蒜辛物

如麻木甚者加芍藥一兩通用二兩

圓明內障并麻湯一名中和養胃湯

治內障眼得之脾胃元氣衰弱心火與三焦俱盛飲食不節形體勞役心不得休息故上為此疾

乾薑一錢

五味子二錢

白茯苓三錢防風五錢

白芍藥六錢柴胡七錢

人參

炙甘草

當歸身

酒洗

白朮

升麻

葛根

已上各一兩

黃芪

羌活

已上各一兩五錢

右吹咀每服五七錢水三大盞煎至二大盞入黃芩

黃連

二錢

同煎數沸去粗煎至一盞熱服食遠

黃芩黃連湯

黃芩

酒洗炒

黃連

酒洗炒

草龍膽

酒洗四次炒四次

生地

黃

酒洗已上各一兩

右吹咀每服二錢水二盞煎至一盞去粗熱服

蔓荊子湯

治勞役飲食不節內障眼病此方如神效

蔓荊子

二錢五分

黃蘗

酒拌炒四遍

白芍藥

已上各三錢

炙甘草

八錢

黃芪

人參

已上各一兩

右咬咀每服二錢或五錢水二盞煎至一盞去粗臨

卧溫服

歸葵湯

一名連翹散子

治目中溜火惡日與火隱澀難開小角緊視物昏花

迎風有淚

柴胡

二分

生甘草

蔓荊子

連翹

生地黄

當歸身

紅葵花

人參

已上各三分

黃芪

酒黃芩

防風

羌活

已上各五分

升麻

一錢

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食後溫服
救苦湯

治眼暴發赤腫臉高苦疼不任者

桔梗

連翹

紅花

細辛

已上一各一

錢

當歸身

夏月減半

炙甘草

已上一各五分

蒼朮

草龍膽

已上一各七分

羌活

太陽

升麻

陽明

柴胡

少陽

防風

藁本

黃連

已上一各一

錢
生地黃

黃蘗

黃芩

知母

已上一

各一錢
五分

川芎

三錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去粗食後溫服
若苦疼則多用苦寒者魚治本經之藥再行加減如

睛昏加知母黃蘗一倍

熟乾地黃丸

治血弱陰虛不能著心致心火旺陽火甚瞳子散大
少陰為火君主無為不行其令相火代之兼心包絡
之脈出心系分為三道少陽相火之體無形其用在
其中矣火盛則令母實乙未肝旺是也心之脈挾於
目系肝連目系況手足少陽之脈同出耳中至耳上
角斜起於目外皆風熱之盛亦從此道而來上攻頭

目致偏頭腫門瞳子散大視物則花此目血虛陰弱
故也法當養血涼血益血收火之散大除風之熱則
愈矣

人參 二錢

炙甘草

天門冬

湯浸
去心

地骨皮

五味子

枳殼

炒

黃連

已上各
三錢

當歸身

酒洗
焙乾

黃芩

已上各
五錢

生地黄

酒洗
七錢五分

柴胡

八錢

熟乾地黄

一兩

右件同為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸

茶湯送下食進二服

益陰腎氣丸

此壯水之主以鎮陽光

澤瀉

茯神

已上各二錢五分

生地黃

酒洗乾

牡丹皮

山茱萸

當歸梢

酒洗

五味子

乾山藥

柴胡

已上各五錢

熟地黃

二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十丸淡鹽湯下空心

菴活退腎丸

治內障右眼小眦青白腎大眦皆微顯白腎腦痛瞳
子散大上熱惡熱大便閉澀小便如常遇天氣暄熱
頭痛睛脹可服此藥腎在大眦加葛根并麻腎在小
眦加柴胡菴活是也

黑附子

炮

寒水石

已上各一錢

酒防已

二錢

知母

酒炒

牡丹皮

菴活

川芎

已上各三錢

酒黃蘗

生地黃

酒洗

丹參

羌蔚子

酒當歸身

柴胡

已上各五錢

熟地黃

八錢芍藥

一兩三錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九白湯下空心宿食未消待飢則服之藥後省語言以食壓之

當歸龍膽湯

治眼中白翳

防風

石膏

已上各一錢五分

柴胡

羌活

五味子

升麻

已上各二錢

甘草

酒黃連

黃芪

已上各三錢

酒黃芩

炒

酒黃蘗

炒

當歸身

酒洗

草龍膽

酒洗

芍藥

已上各五錢

右吹咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗入酒少許
臨卧熱服忌言語

補陽湯

治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通令青白腎
見於大眚及足太陽少陰經中鬱遏足厥陰肝經氣
不得上通於目故青白腎內阻也當於太陽少陰經

中九原之下以益肝中陽氣衝天上行此乃先補其

陽後於足太陽太陰標中

標者頭也

瀉足厥陰肝經火下

伏於陽中乃次治也內經云陰盛陽虛則當先補其
陽後瀉其陰此治法是也每日清晨以腹中無宿食
服補陽湯臨卧服瀉陰丸若天色變經大寒大風并
勞後預日飲食不調精神不足或氣弱俱不可服待
體氣和平天氣如常服之先補其陽使陽氣上升通
於肝經之末利空竅於目矣

肉桂

一錢
去皮

知母

炒

當歸身

酒洗

生地黄

酒炒

白茯苓

澤瀉

陳皮

已上各
三錢

白芍藥

防風

已上各
五錢

黃芪

人參

白朮

羌活

獨活

熟地黄

甘草

已上
各一

兩
柴胡

二兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一大盞去粗空心服

之

瀉陰火丸

一名連藥益陰丸

石決明

三錢炒
存性

羌活

獨活

甘草

當歸梢

五味子

防風

已上各
五錢

草決明

細黃芩

黃連

酒炒

黃蘗

知母

已上各
一兩

右為細末煉蜜為丸如棗豆大每服五十丸至一百丸茶清下常多服補陽湯少服此藥多則妨飲食

升陽柴胡湯

肉桂

五分

柴胡

去苗一
錢五分

知母

酒炒如大者
加作五錢

防風

白茯苓

澤瀉

陳皮

已上各
三錢

生地黃

酒炒

楮實

酒炒
微潤

黃芪

人參

白朮

已上各
五錢

甘草梢

當歸身

羌活

熟地黃

獨活

白芍藥

已上各
一兩

右剉每服五錢水二盞煎至一盞去粗稍熟食遠服
別合一料煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九茶清
下每日與前藥各一服食遠不可飽服

如天氣熱加五味子

三錢

天門冬

去心

芍藥楮實

已上

錢各五

溫衛湯

治鼻不聞香臭目中流火氣無熱冷淚多臍下冷陰汗足痿弱

陳皮

青皮

黃連

木香

已上各三

分人參

甘草 炙

白芷

防風

黃蘗

澤瀉

已上各五分

黃芪

蒼朮

升麻

知母

柴胡

羌活

已上各一錢

當歸身

一錢五分

右都作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服之

圓明膏

治勞心過度飲食失節乃生內障及瞳子散大此方

收睛圓明

訶子皮

濕紙裹煨

甘草

已上各二錢

當歸身

三錢

柴胡

生地黃

麻黃

去節搗開

黃連

已上各五錢

右七味先以水二椀煎麻黃至一椀掠去沫外六味

各咬咀如豆大篩去末入在內同熬滴水不散為

度入熟蜜少許再熬勤點眼

嗜藥麻黃散

治內外障眼

麻黃

一兩

當歸身

一錢

右二味同為麤末炒黑色入麝香乳香少許共為細末含水鼻內嗜之

療本滋腎丸

黃蘗

酒炒

知母

酒炒已上
各等分

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服一百丸至一百五十九空心鹽白湯下

加味滋腎丸

肉桂

三分

黃連

一錢

薑黃

一錢五分

苦參

三錢

苦苧藤

酒洗炒

石膏

覺肚冷勿用

黃蘗

酒炒

知母

酒炒已上

各五錢

右為極細末打薄麵糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心服白湯下食壓之

退賢膏

治黑白腎

薤仁

升麻

已上各三分

連翹

防風

青皮

已上各四分

甘草

柴胡

已上各五分

當歸身

六分

荊芥穗

一錢水半盞別浸

生地黄

一錢五分

黃連

三錢

右用水一椀入前藥煎至半椀去粗更上火煎至半

盞入荊芥水兩匙入蜜少許再上火熬勻點之

龍膽飲子

治疳眼流膿生肝腎濕熱為病

穀精草

川鬱金

蛇退皮

炙甘草

已上

各五分

麻黃

一錢五分

升麻

二錢

青蛤粉

草龍

膽

黃芩

炒

羌活

已上各三錢

右為細末每服二錢食後溫茶清調服之

柴胡聰耳湯

治耳中乾結耳鳴耳聾

連翹

四錢

柴胡

三錢

炙甘草

當歸身

人參

已上各一錢

水蛭

五分炒別研

麝香

少許另研

蜚蠊

三箇去翅

足炒

另研

右除三味別研外生薑三片水二大盞煎至一盞去粗再下三味上火煎一二沸稍熱服食遠

羌活退腎湯

治太陽寒水腎膜遮睛不能視物

羌活

一兩五錢

防風

一兩

荊芥穗

煎成藥加之

薄荷葉

藁本

各七錢

酒知母

五錢

黃蘗

四錢

川芎

當歸身

已上各三錢

小椒

五分

酒生地黄

一錢

細辛

少許

麻黃

二錢用根

右吹咀每服三錢水二大盞煎至一盞半入荊芥穗再煎至一盞去粗稍熱服食遠忌酒醋濕麵等物

還睛紫金丹

治目眵歲久赤爛俗呼為赤瞎是也當以三稜針刺目眶外以瀉濕熱如眼生倒睫拳毛兩目緊蓋內伏火熱而攻陰氣法當去其熱內火邪眼皮緩則毛立

出腎膜亦退用手法攀出內臉向外以針刺之出血

白沙蜜

二十兩

甘石

十兩燒七過碎連水浸拌之

黃丹

六兩水龍

揀連

三兩小便浸碎為末

南乳香

當歸

已上各三錢

烏魚骨

二錢

硃砂

小盞內放於瓶口上熏乾

麝香

已上各一錢

白丁香

真者五分

輕粉

一錢

右將白沙蜜於沙石器內慢火去沫下甘石次下丹以柳枝攪次下餘藥以粘手為度作丸如鷄頭大每用一九溫水化開洗

麗澤通氣湯

治鼻不聞香臭

黃芪

四錢

蒼朮

羌活

獨活

防風

升麻

葛根

已上各三錢

炙甘草

二錢

麻黃

不去節冬月加之

川椒

白芷

已上各一錢

右咬咀每服五錢生薑三片棗二枚葱白三寸同煎至一盞去粗溫服食遠忌一切冷物及風寒涼處坐

卧行立

溫肺湯

治鼻不聞香臭眼多眵淚

丁香

三分

防風

炙甘草

葛根

羌活

已上各一錢

升麻

黃芪

已上各二錢

麻黃

不去節四錢

錢

右為麤末水二盞蔥白三根煎至一盞去粗食後服

禦寒湯

治寒氣風邪傷於皮毛令鼻塞壅寒咳嗽上喘之證

黃連

黃蘗

羌活

已上各二分

炙甘草

佛耳草

款冬花

白芷

防風

已上各三分

升麻

人參

陳皮

已上各五分

蒼朮

七分

黃芪

一錢

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗食後熱服

蘭室秘藏卷上